



# **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**

**ESCUELA DE POST-GRADO**

**Características clínicas y epidemiológicas de la  
enfermedad de Kawasaki en el Hospital Nacional Edgardo  
Rebagliati Martins, periodo 2006-2010**

## **TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Para optar el Título de Especialista en Pediatría

## **AUTOR**

**Rossmery Ponce Robles**

LIMA – PERÚ  
2011

## ÍNDICE

	Pág
01. RESUMEN.....	03
02. CAPITULO I: DATOS GENERALES.....	04
03. CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.....	05
04. CAPITULO III: METODOLOGÍA.....	25
05. CAPITULO IV: RESULTADOS.....	29
06. CAPÍTULO V: DISCUSIÓN.....	44
07. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES.....	47
08. CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES.....	48
09. CAPÍTULO VIII: BIBLIOGRAFÍA.....	49
10. CAPÍTULO IX: ANEXOS	

***“CARACTERISTICAS CLINICAS Y EPIDEMIOLOGICAS DE LA  
ENFERMEDAD DE KAWASAKI EN EL  
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS,  
PERIODO 2006 - 2010”  
AUTORA: ROSSMERY PONCE ROBLES***

**OBJETIVO:** Determinar las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad de Kawasaki en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, periodo 2006-2010. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Es un estudio Observacional, retrospectivo, transversal, descriptivo, conformado por 20 niños menores de 14 años con diagnóstico de Enfermedad de Kawasaki típica y atípica, que ingresaron al Servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el periodo de 2006-2010. **RESULTADOS:** El 85% fueron varones; el 20% menores de 1 año, 65% entre 1-4 años y el 15% mayores de 5 años; en cuanto al tiempo de enfermedad, 55% menos de 7 días y 45% mas de 7 días; dentro de las manifestaciones clínicas el 100% presentó fiebre, rash polimorfo, adenopatías cervicales y los síntomas asociados fueron: articular 85%, irritabilidad 70% gastrointestinal 65%; en cuanto a las pruebas de laboratorio 95% presentó PCR aumentada, 85% leucocitosis, 70% anemia, 65% trombocitosis (con mayor frecuencia en la segunda semana de enfermedad); dentro de las alteraciones electrocardiográficas el 29% lo presentaron, siendo los hallazgos: ectasia de las arterias coronarias (3), pericarditis (1). El 100% recibió Gammaglobulina y Aspirina, el 70% recibió Gammaglobulina antes de los 10 días, un 5% (1) recibió una segunda dosis de Gammaglobulina debido a persistencia de la fiebre. El 95% fueron catalogados como Kawasaki completo y el 5% como incompleto. **CONCLUSIONES:** La EK presenta en nuestro medio una incidencia semejante a la comunicad en Europa y Estado Unidos. El diagnóstico es eminentemente clínico. Es importante iniciar el tratamiento antes de los 10 primeros días de evolución para evitar lesiones coronarias y secuelas que conduzcan a isquemia cardiaca en la adolescencia o en adultos jóvenes. **PALABRAS CLAVES:** Enfermedad de Kawasaki (EK)

## **CAPITULO I**

### **DATOS GENERALES**

#### **1.1 Título**

***“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS Y CLINICAS DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, PERIODO 2006 - 2010”***

#### **1.2 Area de investigación**

CLINICA

**Subárea de investigación**

PEDIATRÍA

#### **1.3 Autor responsable del proyecto**

DRA. ROSSMERY PONCE ROBLES

#### **1.4 Asesor**

DR ERICK SALAS SALAS

#### **1.5 Institución**

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

#### **1.6 Entidades o personas con las que se coordinará el proyecto**

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

#### **1.7 Duración**

SÉIS MESES

#### **1.8 Clave del proyecto**

ENFERMEDAD DE KAWASAKI, CARACTERISTICAS CLINICAS.

## **CAPITULO II**

### **PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO**

#### **2.1 Planteamiento del Problema**

##### **2.1.1 Descripción del problema**

La Enfermedad de Kawasaki (EK) afecta primariamente a niños pequeños y tiene una considerable variabilidad geográfica y racial. La EK es más frecuente en menores de 4 a 5 años, siendo poco frecuente por debajo de los tres meses, aunque puede presentarse en todas las edades, desde la etapa neonatal a la adolescencia. Los varones son más afectados que las niñas, con una relación de 1,4 a 1.

La incidencia de la EK es variable según diferentes países. En Japón es de 108 casos por 100.000 niños menores de cinco años de edad , siendo el país de mayor incidencia. En EE.UU. es de 10 casos por 100.000 niños menores de cinco años de origen no asiático y de 44 casos por 100.000 en los de origen asiático. En Australia la incidencia es de 3,7/100.000 en menores de cinco años, en las Islas Británicas es de 3,6/100.000 menores de cinco años y en Chile 3/100.000 en menores de cinco años.

La mortalidad por EK también es variable según diferentes países. Japón presenta los valores más bajos, descendiendo de 1% en 1974 a menos de 0,1% en 1995, en tanto en otros países es más elevada. En Inglaterra la mortalidad es de 3,7%. Esta diferencia en la mortalidad está vinculada a un mejor reconocimiento de la EK y por ende a un tratamiento precoz y adecuado, en los países en donde EK es más frecuente. La mortalidad es mayor en los varones y en los menores de un año de vida.

En EE.UU., la EK es más frecuente en las clases socioeconómicas medias y altas . A pesar de un mayor conocimiento de EK, la epidemiología continúa evolucionando, pues aún se denuncia en diferentes partes del mundo el retardo en el diagnóstico y tratamiento. El Centers for Disease Control de EE.UU. mantiene sólo una vigilancia pasiva de la enfermedad y en general la medicina occidental no ha tenido la misma reacción que frente a otros problemas emergentes, probablemente a causa de la diversidad y complejidad de los datos, muchas veces controversiales que surgen de la experiencia con EK.

En los países en desarrollo, la EK ha sustituido a la fiebre reumática aguda como la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en los niños (23).

##### **2.1.2 Antecedentes del problema**

La primera descripción de la enfermedad de Kawasaki (EK) fue realizada en Japón por el Dr. Tomisaku Kawasaki en el año 1961. Se trataba de un niño de cuatro años, que ingresó al Hospital de la Cruz Roja en el sexto día de evolución de la enfermedad, que presentaba fiebre, adenopatía cervical, erupción cutánea, congestión conjuntival, alteraciones en labios y boca, ictericia, anemia hemolítica y descamación. Fue tratado con corticoides y antibióticos, siendo dado de alta a los 41 días de iniciada la

enfermedad. Fue considerada como una enfermedad de etiología desconocida, benigna, autolimitada, sin secuelas (1).

En el año 1962, T. Kawasaki realizó una comunicación sobre siete casos clínicos, denominándolos como “síndrome febril no-escarlatina con descamación” y en el año 1964 comunicó 22 casos clínicos más, denominándolos como “síndrome mucocutáneo ocular” (1). A pesar de la acumulación de nuevos casos, muchos clínicos consideraban que no se trataba de una nueva enfermedad, sino de una presentación atípica del síndrome de Stevens-Johnson.

La primera publicación de la EK fue en el año 1967 (2), en idioma japonés, por T. Kawasaki, publicada en una revista de alergia, refiriendo 50 casos clínicos y estableciendo los criterios diagnósticos de la enfermedad. Esta publicación generó controversias en el ambiente médico japonés, sobre todo en lo relacionado al vínculo de la enfermedad con la afectación cardíaca.

La primer publicación en idioma inglés de EK fue realizada por T. Kawasaki en el año 1974, en la revista *Pediatrics* (4), denominándose como “síndrome mucocutáneo ganglionar”. Las primeras observaciones de la EK en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) fueron realizadas en la década de los 70 en Hawai, por parte de dos jóvenes médicos; Marian Melish, especialista en enfermedades infecciosas y Raquel Hicks, pediatra reumatóloga; aunque no establecieron el vínculo con la EK hasta el año 1973, al ver fotos de pacientes con EK procedentes de Japón, habiéndolos considerado previamente como casos de fiebre de origen desconocido con resolución espontánea (1).

En el año 1978 se publicaron en EE.UU., por parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, los criterios diagnósticos de la EK, modificando los originales de T. Kawasaki (8). Después de la publicación de la eficacia de la inmunoglobulina de uso intravenoso (IGIV) para el tratamiento del púrpura trombocitopénico idiopático, se comenzó a utilizar en Japón este régimen terapéutico para la EK (1). En el año 1988 la Academia Americana de Pediatría (AAP) aprobó el uso de IGIV más ácido acetilsalicílico (AAS) (9) y en el año 1993 la American Heart Association (AHA) publicó los criterios diagnósticos y guía terapéutica de la EK (10). Más recientemente, se propusieron nuevos tratamientos con esteroides y agentes antiinflamatorios para aquellos casos de EK que no responden al tratamiento clásico (11,12).

### **2.1.3 Fundamentos**

#### **2.1.3.1 Marco teórico**

La enfermedad de Kawasaki (KD) es una vasculitis sistémica que afecta a arterias de pequeño y mediano calibre y es especialmente frecuente la afectación coronaria.

La etiología de la EK continúa siendo desconocida. Sin embargo, diversos aspectos clínicos y epidemiológicos sugieren una etiología infecciosa. Al ser una enfermedad autolimitada, acompañada de fiebre, exantema, enantema y adenopatía, sugiere una causa infecciosa.

Es una enfermedad que tiene un patrón de incidencia estacional, con mayor predominio durante los meses de primavera e inicio del verano, como sucede en las infecciones virales. El desarrollo de la EK en epidemias en diferentes países, así como mayor incidencia en algunas regiones, es otro factor que sugiere una causa infecciosa.

Otro elemento que soporta la etiología infecciosa es la ocurrencia de EK en hermanos de individuos afectados, los que se enferman la mayoría de las veces (54%) en los primeros 10 días del caso índice, lo que sugiere la exposición a un agente etiológico común, oponiéndose a una predisposición de tipo genético solamente.

La baja frecuencia de la enfermedad en lactantes pequeños y en niños mayores y adultos, es consistente con la hipótesis de que la EK es causada por un agente al cual la mayoría de los adultos son inmunes y que los lactantes están protegidos por anticuerpos maternos.

En contra de la etiología infecciosa, está el hecho de la escasa evidencia de que la EK pueda contagiarse de persona a persona, aunque la mayoría de los individuos podrían presentar una infección asintomática y solo algunos desarrollar síntomas de EK (1,14,24). A pesar de una probable etiología infecciosa, no hay evidencia firme para ningún germen. Se ha vinculado con diferentes virus (parvovirus B19, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr (25), otros herpes virus, virus del sarampión, etcétera), pero no se ha demostrado la implicancia como agente etiológico de ninguno de éstos.

También se ha vinculado a la EK con bacterias (*Mycoplasma pneumoniae*, *Propionibacterium acnes*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Yersinia pseudotuberculosis*, meningococo, etcétera) (26-28).

Existe una considerable evidencia clínica de una posible relación entre el síndrome de shock tóxico (SST) estafilocócico y estreptocócico con la EK. El SST presenta fiebre, afectación eritematosa de las mucosas, erupción cutánea con descamación, signos que comparte con la EK. En forma similar, las enfermedades estreptocócicas mediadas por toxinas (escarlatina) presentan síntomas comunes con la EK. Además de los síntomas comunes al SST y la EK, se ha propuesto que ambas entidades comparten la patogenia del superantígeno, ya que ambas presentan severos disturbios inmunológicos, lo que se reafirma, además, por la respuesta favorable que estas dos entidades tienen al tratamiento con IGIV. Aunque no se ha podido establecer un vínculo definitivo, esta hipótesis es la que más aceptación presenta actualmente (1,14,20,23,24,29).

## **Patología**

La EK es una vasculitis sistémica, que afecta fundamentalmente a las arterias de calibre mediano, aunque también están afectadas pequeñas y grandes arterias, capilares y venas. La afectación de las arterias coronarias es frecuente, siendo la más llamativa ya que puede producir infarto de miocardio. La EK fatal es indistinguible, desde el punto de vista anatomopatológico, de la poliarteritis nodosa, por lo que actualmente se acepta que representan la misma enfermedad. En la etapa aguda de la enfermedad se producen cambios inflamatorios en varios órganos (miocarditis, pericarditis, valvulitis, meningitis aséptica, neumonitis, linfadenopatía, hepatitis), siendo manifestaciones de la presencia de células inflamatorias en los tejidos comprometidos.

En las arterias coronarias, se produce inflamación de la capa media, con edema y necrosis del músculo liso. Se pierde la integridad de la pared, lo que favorece la dilatación y formación de aneurismas. En etapas más avanzadas puede desarrollarse

estenosis y oclusión arterial por trombosis sobreagregada. Aunque la vasculitis de las arterias coronarias es la más conocida, pueden afectarse otras arterias de gran y mediano tamaño con debilitamiento de la pared y formación de aneurismas y estenosis. Las más comúnmente afectadas son: renales, ilíacas, paraováricas, paratesticulares, mesentéricas, pancreáticas, hepáticas, esplénicas y axilares (5,7,30).

### **Manifestaciones clínicas clásicas (3,6,7,9,10,23,24)**

El diagnóstico de EK es clínico. No existe ningún examen ni test de laboratorio específico.

El diagnóstico se basa en el reconocimiento de los aspectos clínicos, que incluyen:

- ❖ **Fiebre** de más de cinco días de duración;
- ❖ Presencia de cuatro de cinco criterios principales (afectación ocular, cambios en labios y boca, erupción cutánea, cambios en las extremidades, adenopatía de cuello);
- ❖ Sin otra causa que explique la enfermedad (tabla 1).

**Tabla 1. Criterios diagnósticos de EK**

- Fiebre de más de 5 días de duración.
- Cuatro de los siguientes 5 signos:
  - Conjuntivitis bilateral no exudativa
  - Rash polimorfo
  - Cambios en labios y boca
    - Labios rojos, secos, fisurados
    - Eritema de boca y faringe
  - Cambios en extremidades
    - Eritema de palmas y plantas
    - Edema de manos y pies
    - Descamación manos, pies, periné
  - Adenopatía cervical
    - Mayor 15 mm, unilateral, única, dolorosa, no supurada
- No evidencia de otra enfermedad que explique las manifestaciones clínicas.



Los pacientes que presentan cuatro criterios principales (incluyendo la fiebre), pueden ser catalogados como EK.

La bibliografía de origen japonés considera que si sólo se detectan cuatro de los síntomas clásicos, la enfermedad se cataloga como Kawasaki atípico, y si hay tres síntomas principales se cataloga como Kawasaki sospechoso.

En Japón no se requiere estudio ecocardiográfico para realizar el diagnóstico cuando la sintomatología no es completa.

La bibliografía de origen estadounidense, en tanto, requiere para catalogar como Kawasaki atípico tres o menos de los síntomas clásicos y demostrar la presencia de aneurismas coronarios. El requisito de demostrar anomalías coronarias para catalogar un caso de EK como incompleto o atípico ha sido cuestionado por algunos autores, ya que se corre el riesgo de no diagnosticar la enfermedad en algunos pacientes (19,24).

En casos de fiebre de menos de cinco días de duración y presencia de los otros signos clásicos, puede realizarse diagnóstico de EK por parte de médicos experimentados en el diagnóstico de la enfermedad.

1) **Fiebre:** la fiebre es generalmente elevada: 39 a 40°C, o mayor. El primer día de la fiebre es considerado el primer día de la enfermedad, aunque algunos pacientes pueden presentar uno o más de los otros síntomas clínicos el día antes del inicio de la fiebre. La duración de la fiebre, en ausencia de tratamiento, es de una a dos semanas, pero puede prolongarse hasta tres o cuatro semanas. Con el tratamiento adecuado (IGIV y AAS), la fiebre remite en uno a dos días después de iniciado el mismo.

2) **Afectación ocular:** a nivel ocular se evidencia una hiperemia conjuntival, que es característica. La afectación de la conjuntiva bulbar es más evidente que la de la conjuntiva palpebral. No se acompaña de exudado, configurando una “conjuntivitis seca”, aunque estrictamente no está afectada la conjuntiva, sino que es la presencia de pequeños vasos dilatados la que determina el enrojecimiento. La hiperemia conjuntival es más débil alrededor del iris, formando un halo más claro alrededor del mismo. Es frecuente la presencia de uveítis anterior, lo que puede detectarse por lámpara de hendidura

3) **Cambios en labios y boca:** los cambios en los labios se manifiestan por eritema, sequedad, fisuras y sangrado espontáneo o al mínimo tacto. A nivel de la boca se evidencia eritema de la mucosa oral faríngea, lengua aframbuesada con papilas prominentes eritematosas. No se observan ulceraciones, exudados, ni manchas de Koplik. La lengua aframbuesada no es específica de la EK, y puede estar presente en otras enfermedades mediadas por toxinas (enfermedades estreptocócicas y estafilocócicas). Las alteraciones en ojos y boca determinan una imagen características.

4) **Erupción cutánea:** las manifestaciones cutáneas pueden adoptar varias formas de presentación. Lo más característico es la presencia de un *rash* cutáneo eritematoso, polimorfo, máculo-papular no específico. En ocasiones se presenta una erupción de tipo escarlatiniforme o con manifestaciones similares al eritema polimorfo. No se presentan vesículas ni bullas. En ocasiones pueden presentarse pequeñas pústulas, sobre todo en las zonas de extensión. Las lesiones elementales pueden acompañarse de púrpura, lo que es poco frecuente, pero característico. Las manifestaciones cutáneas se acentúan con la fiebre y son cambiantes. El eritema cutáneo es más marcado en el área del pañal, siendo

fácilmente confundido con una dermatitis del pañal o candidiasis. Las manifestaciones cutáneas en el área perineal también se presentan en enfermedades estreptocócicas y estafilocócicas. La descamación cutánea en la fase aguda de la enfermedad está presente sobre todo en el área perineal, afectando el escroto en los varones y en las niñas los labios mayores (50%). Estas manifestaciones se observan tanto en los niños que utilizan pañales como en los que no los usan. Es frecuente la descamación perianal y la presencia de eritema a nivel del meato urinario.

5) **Cambios en las extremidades:** a nivel de las extremidades se presenta eritema bilateral de las palmas y de las plantas. Se caracteriza por ser intenso, con cambios abruptos, llegando a desaparecer, dejando una piel de características normales, para posteriormente reaparecer. Se intensifica con la fiebre.

Las manos y pies presentan edema, sobre todo a nivel del dorso, que no deja fovea. Es un edema “molesto”, evidenciándose porque el niño “no quiere pararse”, “no quiere caminar”, o no puede sostener objetos con sus manos. Esto es debido al dolor determinado por la inflamación de pequeñas y medianas articulaciones. La inflamación articular puede afectar medianas y grandes articulaciones, aunque lo más frecuente es que afecte a las de pequeño tamaño, evidenciándose a nivel de las manos por la presencia de dedos de aspecto fusiforme. El dolor aumenta con la movilización, y en el lactante se manifiesta por llanto al movilizarlo.

En la etapa de convalecencia de la enfermedad, se observa descamación a nivel periungueal, que puede acompañarse de otras alteraciones en las uñas y descamación en las plantas. Después de uno a dos meses de la enfermedad, pueden desarrollarse surcos transversales en las uñas (líneas de Beau). Esta líneas desaparecen con el crecimiento de la uña y en ocasiones se produce el recambio de ésta.

6) **Adenopatía cervical:** la adenopatía cervical es el signo menos frecuente en comparación con las otras manifestaciones clínicas. Aunque se considera que el tamaño de la adenopatía debe tener como mínimo 1,5 cm, cuando está presente es notoria. Habitualmente es unilateral. Puede acompañarse de eritema la piel, pero la adenopatía no presenta fluctuación, y no se obtiene pus si es puncionada. En ocasiones se han asistido niños con EK que inicialmente son catalogados como portadores de una adenitis de cuello, debiéndose tener en cuenta a la EK en los pacientes con adenopatía inflamatoria de cuello que no responde a los antibióticos y que no tiene otra causa que la explique.

### **Otras manifestaciones clínicas (3,6,7,9,10,23,24)**

Una gran variedad de síntomas y signos se presentan en la EK, aunque no están incluidos en los criterios diagnósticos.

Un signo de gran valor, y que habitualmente está presente, es la **irritabilidad**. Ésta es intensa, a diferencia de otras enfermedades exantemáticas, y se presenta sobre todo en lactantes, lo que frecuentemente determina la realización de punción lumbar para descartar meningitis.

Aproximadamente un cuarto de los pacientes con EK tiene **meningitis aséptica**, con presencia de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo, con recuento entre 15–100 elementos/mm<sup>3</sup>, con valores de glucosa normal y moderada elevación de las proteínas. No es necesaria la realización de punción lumbar en forma sistemática para el diagnóstico de EK.

Un signo de gran valor es la presencia de **eritema e induración en el sitio de inoculación de la vacuna BCG**, cuando ésta se ha aplicado en forma reciente (seis

meses a un año). Este signo está presente en el 36% de los casos y ha sido incorporado en las guías diagnósticas de la EK en Japón (1).

Es frecuente la presencia de **artralgia** y de **artritis**. Se afectan las manos, rodillas y codos, y ocasionalmente caderas. La afectación articular puede estar presente en la primera semana de la enfermedad o puede presentarse en forma tardía, en la segunda o tercera semana de enfermedad.

Desde que se realiza el tratamiento precoz, estas manifestaciones son menos frecuentes. El líquido sinovial, en las artritis precoces presenta elevado recuento de células (100.000 – 300.000 elementos/mm<sup>3</sup>), con predominio de polimorfonucleares, en tanto que las de manifestación tardía presentan menor celularidad (50.000 elementos/ mm<sup>3</sup>), con 50% de polimorfonucleares.

Se presentan alteraciones a nivel **hepático**, manifestadas por elevación en el valor de las transaminasas, y en ocasiones se acompaña de ictericia.

La distensión de la **vesícula biliar** es frecuente, manifestándose por dolor en hipocondrio derecho. La ecografía evidencia una distensión alitiásica. No requiere tratamiento quirúrgico.

Otras manifestaciones menos frecuentes son **diarrea**, **neumonitis**, **otitis media**, **uretritis con piuria estéril**. En ocasiones la EK puede presentarse con predominancia de síntomas de afectación del sistema nervioso central, como convulsiones, alteraciones del estado de conciencia, hemiplejia, parálisis facial, ataxia, sordera neurosensorial, infarto cerebral y derrame subdural.

Algunos pacientes con manifestaciones neurológicas pueden quedar con secuelas permanentes (31,32,). Las manifestaciones cutáneas pueden adoptar formas clínicas llamativas, como psoriasis guttata, erupciones verrugosas e hiperqueratósicas, con eliminación de moldes cutáneos de los dedos (33,34).

### **Manifestaciones cardíacas (3,6,7,9,10,23,24)**

Las manifestaciones cardíacas son uno de los hechos más importantes en la EK.

#### ***Dilatación y aneurismas coronarios***

Aproximadamente el 15-25% de los niños no tratados desarrollan anomalías coronarias, incluyendo dilatación difusa y formación de aneurismas. La dilatación coronaria puede detectarse a partir de los 7-10 días de iniciada la enfermedad, pero es entre la tercera y cuarta semana en donde se produce el pico de mayor incidencia (35,36).

Se define arteria coronaria normal como la medida < 2 DS de un niño sano con similar superficie corporal.

**Ectasia** coronaria se define como una medida > 2 DS de un niño sano con similar superficie corporal, con un diámetro máximo de 4 mm.

**Aneurisma** coronario se define como una medida entre 4 a 8 mm de diámetro, y **aneurisma gigante** si mide más de 8mm de diámetro (37).

Es fundamental que la medida de las arterias coronarias sea realizada por ecocardiografista con amplia experiencia en niños. El desarrollo de aneurismas coronarios se vincula con el riesgo de muerte súbita, por trombosis coronaria e infarto agudo de miocardio. En el seguimiento a largo plazo de los pacientes con dilataciones coronarias y aneurismas, se evidenció que el retroceso de las anomalías coronarias es un hecho frecuente, hasta en 50% de los casos, y en los restantes se evidenció disminución del tamaño de aneurismas, con o sin estenosis coronaria (25%), retroceso de aneurismas pero con estenosis coronaria (15%) y en los restantes finas irregularidades de los vasos coronarios pero sin estenosis (10%). En seguimientos a largo plazo, se estima que 40%

de los pacientes con aneurismas coronarios persistentes y estenosis coronaria desarrollan infarto de miocardio (38).

La forma más severa de afectación coronaria es el desarrollo de aneurismas gigantes ( $\geq 8\text{mm}$ ). Estos aneurismas tienen menos probabilidad de retroceder y son frecuentes las complicaciones (trombosis, ruptura, estenosis). El porcentaje de niños con EK que desarrollarán aneurismas gigantes es variable, reportándose valores de entre 1 a 4%, con una mortalidad elevada (39).

Si se realiza tratamiento con IGIV y AAS antes de los 10 días de iniciada la enfermedad, la incidencia de alteraciones coronarias disminuye notoriamente, a porcentajes  $< 5\%$  (40).

La afectación de otras arterias puede ser causa de manifestaciones poco habituales aunque severas, como gangrena de extremidades por isquemia periférica, cuando se comprometen las arterias axilares o isquemia intestino-mesentérica por afectación de las arterias mesentéricas (40).

### ***Infarto agudo de miocardio***

Está vinculado a la presencia de anomalías coronarias. Su manifestación clínica es diferente a la del adulto. La forma de presentación es variada, inespecífica, y en ocasiones de diagnóstico difícil: shock, vómitos, dolor abdominal, palidez, diaforesis, llanto, debilidad. En niños grandes puede presentarse con dolor torácico. En la mayoría se presenta durante el sueño o el reposo y en ocasiones es asintomático. Puede ser causa de muerte súbita. Las manifestaciones electrocardiográficas y los cambios en las enzimas cardíacas son típicas. Es más frecuente en la fase subaguda de la enfermedad, momento de mayor frecuencia de aneurismas coronarios, pero también se puede presentar en la fase aguda o en etapas más tardías (35).

### ***Otras manifestaciones cardíacas***

La **miocarditis** es la manifestación cardíaca más frecuente en la fase aguda de la EK de compromiso no coronario, presentándose en hasta el 50% de los pacientes. Se manifiesta por taquicardia desproporcionada al grado de fiebre. No es frecuente que se acompañe de insuficiencia cardíaca congestiva o shock cardiogénico. Puede acompañarse de **arritmias cardíacas**. Los cambios electrocardiográficos que pueden evidenciar miocarditis son: prolongación del espacio PR, alteraciones en el segmento ST y onda T, y disminución de voltaje de la onda R. La **pericarditis con derrame pericárdico** está presente en el 25% de los casos en la fase aguda. Puede presentarse compromiso valvular, evidenciado por **valvulitis**, sobre todo insuficiencia mitral (1).

**Tabla 2.** Incidencia de síntomas en la EK

Síntomas	Porcentaje
Conjuntivitis	94%
Rash	92%
Cambios en labios y boca	
• Labios rojos, secos, fisurados	70%
• Lengua aframbuesada	71%
• Eritema de boca y faringe	70%
Cambios en las extremidades	
• Eritema de palmas y plantas	80%
• Edema de manos y pies	67%
• Descamación de manos y pies	29%
Adenopatía cervical	42%

**Fases clínicas de la enfermedad** (3,6,7,9,10,23,24)

El curso de la EK puede ser dividido en tres fases clínicas: agudo, sub-agudo y convalecencia (tabla 3).

La *fase aguda* dura entre una a dos semanas, se caracteriza por fiebre y las manifestaciones clásicas de la enfermedad. Es en esta etapa que se presenta la miocarditis y la pericarditis. La arteritis está presente, pero rara vez se detectan la presencia de aneurismas por ecocardiografía.

La *fase subaguda* comienza cuando retrocede la fiebre, la erupción cutánea y la adenopatía cervical, pero puede persistir irritabilidad, anorexia y la hiperemia conjuntival, con descamación a nivel de los dedos y pies. Esta fase se prolonga habitualmente hasta cuatro semanas de iniciada la enfermedad. Los aneurismas de las arterias coronarias se desarrollan en esta fase y el riesgo de muerte súbita es elevado.

La *etapa de convalecencia* se prolonga hasta que retrocede toda la sintomatología y finaliza cuando se normaliza el valor de la velocidad de eritrosedimentación (VES), habitualmente en plazos de 6 a 8 semanas de iniciada la enfermedad.

**Tabla 3.** Fases clínicas de la EK.

Fase	Características	Duración
Aguda, febril	Fiebre más otras manifestaciones agudas Miocarditis Pericarditis	1 –2 semanas
Subaguda	Resolución de la fiebre Posible persistencia de hiperemia conjuntival e irritabilidad Descamación de dedos Arteritis coronaria Aneurismas Riesgo de muerte súbita	Hasta día 30 de la enfermedad
Convalecencia	Resolución de todos los signos de la enfermedad	6-8 semanas de inicio de la enfermedad

### “Kawasaki atípico”

Desde la perspectiva clínica, la necesidad de reconocer tempranamente la EK ha permitido definir, cada vez más, que un número importante de casos de la enfermedad no reúne las características clásicas y cerca de un 40% de los pacientes que desarrollan alteraciones coronarias tienen presentaciones atípicas (20).

Estos niños presentan fiebre y menos de los cuatro síntomas requeridos para diagnosticar EK. A estos casos se les denomina “Kawasaki atípico” o “Kawasaki incompleto”. Se estima que al menos 10% de los casos de EK son incompletos (24). Estos casos son más frecuentes en niños pequeños, sobre todo lactantes, en donde la probabilidad de desarrollar aneurismas coronarios es mayor.

El diagnóstico en estas situaciones puede ser difícil y se debe tener un alto índice de sospecha ante niños de corta edad que presentan fiebre prolongada sin una causa evidente, o con algunas de las manifestaciones clásicas de la enfermedad. El estudio ecocardiográfico puede ser de gran ayuda, si detecta la presencia de aneurismas coronarios, pero su ausencia no invalida sospechar la enfermedad.

Se ha vinculado una mayor incidencia de aneurismas coronarios en los pacientes con Kawasaki atípico, probablemente por demoras en el diagnóstico (7,23). En revisiones recientes se ha determinado que cada vez se diagnostican con mayor frecuencia casos de EK que no cumplen con los criterios diagnósticos clásicos, y que reciben tratamiento con IGIV más AAS. Esta conducta parece estar justificada, ya que esperar a realizar el diagnóstico de EK sobre la base de los criterios diagnósticos clásicos, determinaría mayor incidencia de desarrollo de aneurismas coronarios, al excluir a los niños que se presentan con síntomas incompletos. El reconocimiento y tratamiento temprano de la enfermedad son vitales para prevenir las complicaciones cardíacas. Los pacientes con Kawasaki atípico presentan las mismas alteraciones de laboratorio que los que se presentan con la forma clásica y completa.

## Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial se plantea con enfermedades febriles que cursan con erupción cutánea: escarlatina, síndrome de piel escaldada, síndrome de shock tóxico, síndrome de Stevens-Johnson, reacción a drogas, artritis reumatoidea juvenil, infecciones virales (adenovirus), sarampión, leptospirosis, infección por rickettsias.

Habitualmente estas entidades pueden diferenciarse por medio de la clínica.

La infección viral por adenovirus puede tener presentación clínica similar a EK. La detección de antígenos virales por medio de tests rápidos (inmunofluorescencia) en aspirado nasofaríngeo de secreciones puede ayudar al diagnóstico.

Cuando se plantea diagnóstico diferencial con escarlatina, el aislamiento de estreptococo beta hemolítico de grupo A (EBHGA) en el exudado faríngeo puede ayudar al diagnóstico. Se debe tener en cuenta que 20-25% de los niños pueden ser portadores de EBHGA, por lo que algunos niños con EK pueden tener cultivos positivos por este organismo. Como los pacientes con escarlatina tienen una rápida mejoría cuando se tratan con antibióticos, se puede diferenciar estas entidades en función de la respuesta clínica rápida, luego de 24 a 48 horas de tratamiento (1).

La presentación de un paciente en la emergencia con “ojo rojo”, fiebre prolongada y erupción cutánea, puede ser debida a diferentes causas. Tener en cuenta las diferentes etiologías puede ayudar al diagnóstico en casos difíciles. El análisis ocular con lámpara de hendidura puede evidenciar uveítis anterior (tabla 4).

En los niños mayores de cinco años y adolescentes puede equivocarse el diagnóstico, por no tener en mente a la EK en este grupo etario (20).

En casos de EK que no responden al tratamiento con IGIV, debe tenerse en cuenta la poliarteritis nodosa infantil, artritis reumatoidea juvenil de inicio sistémico y enfermedades malignas como el linfoma.

**Tabla 4.** Diagnóstico diferencial de ojo rojo, fiebre prolongada y erupción cutánea

1. Enfermedad de Kawasaki\*.
2. Enfermedades estreptocócicas y estafilocócicas mediadas por toxinas (escarlatina, síndrome de shock tóxico).
3. Infección por adenovirus y otros (enterovirus, sarampión\*).
4. Reacción a drogas y síndrome de Stevens-Johnson\*.
5. Leptospirosis\*.
6. Infección por *Yersinia pseudotuberculosis*.
7. Infección por rickettsias.
8. Síndrome de Reiter\*.
9. Enfermedad inflamatoria intestinal\*.
10. Enfermedad post-infecciosa mediada por complejos\* (por ejemplo post-meningococcemia).
11. Sarcoidosis\*.
12. Lupus eritematoso sistémico\*.
13. Bechet\*.

\* Uveítis anterior.

## Laboratorio

Los hallazgos de laboratorio en EK no son específicos de la enfermedad, pero presentan características particulares.

En la fase aguda de la enfermedad, existe aumento de los glóbulos blancos con predominio de neutrófilos con desviación a izquierda de la fórmula leucocitaria. Puede presentarse eosinofilia, hasta en un tercio de los casos. La leucopenia no se presenta en la EK y su presencia debe hacer dudar del diagnóstico (7). Es frecuente la anemia normocítica y normocrómica. Se ha vinculado con aumento de lesiones coronarias, sobre todo si es intensa (23).

El recuento plaquetario es normal en la fase aguda de EK, presentándose trombocitosis en la fase sub-aguda (segunda a tercera semana), elemento característico de la EK, con valores elevados, de hasta 1 millón/dl. La presencia de plaquetopenia en la fase aguda se asocia con mayor incidencia de lesiones coronarias e infarto de miocardio. Es una



manifestación poco frecuente, invocándose un mecanismo autoinmune ya que responde al tratamiento con IGIV .

La VES y la PCR están elevadas en la fase aguda y pueden persistir valores elevados durante cuatro a seis semanas. La persistencia de VES elevada después que la fiebre ha desaparecido puede ayudar a distinguir la EK de otras enfermedades febriles acompañadas de erupción cutánea.

La evolución de los valores de la VES y PCR no necesariamente van juntas, ya que elevaciones modestas de la VES pueden acompañarse de valores muy elevados de la PCR.

En etapas precoces de EK existe hipercoagulabilidad asociada a un aumento del “turnover” plaquetario y a depleción del sistema fibrinolítico.

En el examen de orina se detecta piuria estéril. Las células se originan en la uretra por lo que no son detectadas si la orina se recoge de la vejiga por cateterismo vesical. No son detectadas por las tirillas reactivas de uso habitual.

A nivel del líquido cefalorraquídeo se detecta en 1/3 de los pacientes con EK a los que se les realizó punción lumbar, pleocitosis con predominio de monoculares. No es frecuente la hipogluorraquia ni aumento de proteínas.

Es frecuente el aumento en el valor de las transaminasas en la fase aguda, que pueden adoptar un perfil de tipo colestático con aumento de las bilirrubinas. LaGGTestá elevada en 2/3 de los casos. La presencia de hipoalbuminemia se vincula a mal pronóstico (21).

Son frecuentes las alteraciones inmunológicas. En las etapas iniciales existe disminución de IgG, y en la fase subaguda aumento en valores de IgG, IgM, IgA e IgE (7,23).

En la evaluación de un paciente con EK con dificultades para catalogarlo como tal, es frecuente la realización de otros exámenes para descartar otros diagnósticos: hemocultivos, exudado faríngeo, perfil de autoinmunidad (anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, anticuerpos ANCA), serología para bacterias y virus.

La evaluación cardiológica requiere radiografía de tórax, ECG y ecocardiografía. La dosificación de troponina en la fase aguda de EK, puede indicar presencia de miocarditis, aunque no es un hecho consistente por lo que no es de uso rutinario.

## **Tratamiento (7,14,17,23,24,40)**

El tratamiento estándar de EK se realiza con altas dosis de IGIV y AAS.

### **Inmunoglobulina de uso intravenoso (IGIV)**

La administración de IGIV 2 gr/kg en infusión de 12 horas, antes del 10º día de iniciada la enfermedad, reduce la incidencia de aneurismas coronarios de 20% a menos de 4%. Produce una rápida defervescencia de la fiebre y los síntomas asociados con rápida normalización de los valores de los reactantes de fase aguda, y además mejora la función miocárdica. En los pacientes con falla cardíaca aguda puede ser necesaria la administración en forma más lenta para evitar sobrecarga de volumen.

### **Ácido acetilsalicílico (AAS)**

El AAS se inicia con dosis elevadas, de 80-100 mg/kg/día divididos en 4 dosis diarias, buscando un efecto antiinflamatorio, que se mantiene hasta por lo menos pasados 3-4

días de apirexia (algunos autores recomiendan mantener esta dosis hasta el día 14 de iniciada la enfermedad). Ésta es la dosis recomendada por la AAP y la AHA.

En Japón se utilizan dosis más bajas de AAS (30-50 mg/kg/día). Posteriormente se continúa con dosis menor, 3-5 mg/kg/día en una toma diaria, buscando un efecto antiplaquetario y antitrombótico, que se mantendrá como mínimo seis semanas. Si se detectan anomalías coronarias se mantiene el tratamiento profiláctico con AAS, hasta que se resuelva el problema.

En EK está alterada la farmacocinética del AAS, con disminución de la absorción y aumento del *clearance*, por lo que es difícil mantener rangos de salicilemia en valores terapéuticos. Habitualmente el tratamiento con AAS en EK no determina mayor riesgo de intoxicación, pero es recomendable monitorizar los niveles séricos, sobre todo cuando se utilizan dosis elevadas.

En los pacientes en los que se demoró el inicio del tratamiento más allá del décimo día de la enfermedad, está indicado el tratamiento con IGIV si persisten febriles o presentan signos de actividad de la enfermedad, ya que hay mayor posibilidad de desarrollar aneurismas coronarios. Si el paciente se presenta con más de 10 días de evolución, con varios días de apirexia y descamación, no está indicada la administración de IGIV, ya que no hay datos que sugieran la eficacia en esta situación, ya que la IGIV no previene la enfermedad coronaria después de la fase aguda de la enfermedad cuando la respuesta inflamatoria ha disminuido.

Si se realiza el diagnóstico de EK en forma precoz, antes del quinto día de iniciada la enfermedad, está justificado el tratamiento con IGIV, ya que se ha determinado que mejora el pronóstico a largo plazo de secuelas coronarias y disminución de la duración de los síntomas (10). Otros autores no han confirmado estos resultados, incluso informan mayor incidencia de lesiones coronarias cuando se realiza tratamiento temprano (tercer día), con la limitante que no utilizan el régimen de 2 g/kg de IGIV sino que utilizan el régimen de 400 mg/kg/día en tres a cuatro días (el régimen de 2 g/kg no está aprobado en Japón en forma sistemática por razones económicas, aunque ha demostrado ser superior que el de dosis menores).

En los pacientes que no cumplen con los criterios clásicos, “Kawasaki atípico” o “Kawasaki incompleto”, no debe retrasarse el tratamiento (14). El médico actuante debe ejercer su mejor juicio clínico para identificar y tratar a los pacientes con EK que no cumplen con los requisitos clásicos de caso definitivo, para reducir la incidencia de complicaciones cardíacas y no ceñirse estrictamente a los plazos establecidos. El requisito de fiebre de cinco días o más no debe entenderse literalmente. La mención de T. Kawasaki de 5 días o más fue hecha en otro contexto, en el que el sarampión era un problema diagnóstico diferencial.

### **Falla de tratamiento**

No todos los pacientes con EK responden al tratamiento inicial con IGIV y persisten febriles después de su administración o reiteran fiebre y otros síntomas de la enfermedad en los primeros dos días luego de un período de apirexia. Se estima que 10% a 30% de los pacientes no responden al tratamiento inicial con IGIV. El tratamiento óptimo de estos pacientes no está definitivamente establecido, pero actualmente existe consenso en reiterar la IGIV en caso de falla de tratamiento. En algunas series de pacientes se han requerido reiterar dos a tres veces las infusiones de IGIV (11).

## **Corticoides**

Muchos clínicos proponen, en caso de falla de tratamiento, asociar a la IGIV el uso de corticoides. Aunque las referencias iniciales sobre los corticoides vinculaban su uso a mayor incidencia de lesiones coronarias, actualmente se plantea utilizarlos en aquellos pacientes que no responden a la primera o segunda infusión de IGIV, obteniéndose resultados favorables. Se utiliza metilprednisolona a dosis de 30 mg/kg/día durante tres días (11). En casos seleccionados de pacientes que no responden a estos regímenes terapéuticos, se han utilizado inmunosupresores como la ciclosporina (11). Comunicaciones recientes, que hacen hincapié en el mecanismo lesional a nivel arterial mediado por radicales libres de oxígeno, proponen el uso de sustancias antioxidantes (alfa-tocoferol, ácido ascórbico), en caso de no respuesta al tratamiento inicial. Más estudios se necesitan para este grupo de pacientes con la finalidad de establecer protocolos de tratamiento ampliamente probados.

Si se desarrollan aneurismas coronarios debe continuarse el tratamiento con AAS en tanto éstos persistan. Algunos autores proponen sustituir el AAS o agregar un antiagregante plaquetario como el dipiridamol a dosis de 2-3 mg/kg dos a tres veces por día. Si se desarrolla infarto agudo de miocardio, es necesario realizar tratamiento trombolítico.

## **Factores de riesgo**

Actualmente se otorga gran importancia a la detección de factores de riesgo que pronostiquen falla de tratamiento o mayor incidencia de lesiones coronarias, para de esta manera estar más vigilantes en este grupo de pacientes.

Los hallazgos de laboratorio traducen la intensidad de la respuesta inflamatoria. Los valores elevados de leucocitos con predominio de neutrófilos (menos de 68%), el descenso en el valor de la hemoglobina (más de 10 g/dl), la hipoalbuminemia, la plaquetopenia, aumento de enzimas hepáticas, sobre todo LDH mayor a 590 UI/l, valores elevados de la PCR y VES, persistencia de leucocitosis elevada después de IGIV, presencia de factor estimulante de colonias de granulocitos, se han vinculado con mal pronóstico.

El score de Harada se utiliza para predecir lesiones en las arterias coronarias en pacientes con EK, si presenta al menos cuatro de los siguientes siete elementos:

- 1) leucocitosis mayor a 12.000 elementos/mm<sup>3</sup>,
- 2) recuento plaquetario menor de 35 x 10<sup>4</sup> elementos/mm<sup>3</sup>,
- 3) PCR elevada,
- 4) hematocrito menor a 35%,
- 5) albúmina menor a 3,5 g/dl,
- 6) edad mayor de 12 meses y
- 7) sexo masculino.

Otro factor de riesgo de desarrollar lesiones coronarias es la recurrencia de la enfermedad. La frecuencia de casos recurrentes es de 3%.

## **Manejo después de la fase aguda**

Si el paciente tiene una respuesta favorable al tratamiento con IGIV + AAS, habitualmente se produce remisión de los síntomas en 24 horas. Debe mantenerse la internación durante 24-48 horas después de lograda la apirexia. Los controles clínicos deben realizarse en forma semanal durante la fase subaguda y de convalecencia.

Es necesario reiterar un ecocardiograma a las 2-3 semanas del inicio de la enfermedad, que debe reiterarse a las 6-8 semanas, si el estudio previo fue normal. Debe realizarse ecocardiograma al año de la enfermedad, y si éste es normal no se recomienda realizar nuevos estudios.

Los exámenes de laboratorio (hemograma, VES, PCR) se repiten en los mismos plazos. Cuando los valores de los reactantes de inflamación se normalizan (habitualmente a las 6-8 semanas) y si el ecocardiograma no demuestra alteraciones coronarias, se suspende la administración de AAS.

Los plazos señalados para los controles pueden adaptarse a situaciones particulares, en función de la presencia de factores de riesgo previamente establecidos.

La administración de vacunas con virus vivos atenuados (sarampión, rubéola, paperas, varicela) debe posponerse entre 6 a 11 meses después de haber recibido IGIV, ya que ésta puede impedir el desarrollo de una respuesta inmune adecuada.

En caso de exposición al virus de varicela en un paciente con EK que no tuvo la enfermedad y que está recibiendo AAS, debe considerarse la suspensión de AAS, por riesgo de desarrollar síndrome de Reye. En este caso puede sustituirse el AAS por dipiridamol. También debe considerarse la administración de vacuna antigripal a los pacientes que permanecen en tratamiento crónico con AAS, para reducir el riesgo de síndrome de Reye.

Los niños que presentan anomalías coronarias deben controlarse con cardiólogo pediatra, quien decidirá la frecuencia de la realización de estudios (ECG, ecocardiograma, estudios dinámicos, coronariografía), necesidad de tratamiento anticoagulante y tratamientos quirúrgicos. Si no se detectan anomalías coronarias en la fase aguda o subaguda de la enfermedad, no hay evidencia firme de alteraciones vasculares a largo plazo y los pacientes no presentan mayor mortalidad que el resto de la población, aunque actualmente este concepto está en revisión. Se ha establecido que los pacientes que padecieron EK presentan alteraciones electrocardiográficas con mayor frecuencia (tres veces) que la población control, alteraciones isquémicas silentes cuando se estudian con test de stress con dobutamina o perfiles lipídicos alterados con potencial riesgo de aterosclerosis. Más estudios se requieren para sacar conclusiones definitivas.

### **Manejo a largo plazo**

El manejo a largo plazo de los pacientes con EK depende del grado de afectación de las arterias coronarias y se realiza en base a la estratificación por grupos según el riesgo relativo de isquemia miocárdica. El seguimiento por especialistas requiere el acceso a tecnología de estudio avanzada como: ergometría de esfuerzo, tests de estrés farmacológicos (dobutamina, dipiridamol, adenosina) para niños pequeños que no pueden realizar esfuerzo físico en bicicleta o en la cinta, estudios radioisotópicos de perfusión miocárdica, valoración con ecocardiografía de la motilidad regional de la pared ventricular, utilización de resonancia nuclear magnética, etcétera.

**Tabla 5.** Seguimiento a largo plazo del paciente con EK

Nivel de riesgo	Tratamiento farmacológico	Actividad física	Seguimiento y test diagnóstico	Tests invasivos
Nivel I. Sin alteraciones en arterias coronarias en ningún momento de la enfermedad	Ninguno después de las 6 a 8 semanas iniciales	Sin restricciones después de las 6 a 8 semanas iniciales	Ninguno después del primer año, salvo que se sospeche enfermedad cardíaca	No recomendado
Nivel II. Ectasia coronaria transitoria que retrocede durante la fase aguda	Ninguno después de las 6 a 8 semanas iniciales	Sin restricciones después de las 6 a 8 semanas iniciales	Ninguno después del primer año, salvo que se sospeche enfermedad cardíaca. El médico puede elegir controlar al paciente cada 3 a 5 años	No recomendado
Nivel III. Aneurisma coronario solitario pequeño a mediano	3-5 mg/kg/día de AAS, hasta que la anomalía se resuelva	Para los pacientes en la primera década de la vida, sin restricciones después de las 6 a 8 semanas iniciales. Para los pacientes en la segunda década, la actividad física debe ser guiada a través de tests de estrés todos los años. Las competencias atléticas con contacto y entrenamiento de resistencia, deben desaconsejarse	Seguimiento anual con ecocardiograma y/o electrocardiograma en la primera década de la vida	Angiografía, si los tests de estrés o la ecocardiografía sugiere estenosis
Nivel IV. Uno o más aneurismas coronarios gigantes, o múltiples aneurismas pequeños o medianos sin obstrucción	3-5 mg/kg/día de AAS en forma continua y/o warfarina	Para los pacientes en la primera década de la vida, sin restricciones después de las 6 a 8 semanas iniciales. Para los pacientes en la segunda década las recomendaciones son guiadas por los tests de estrés. Los deportes enérgicos deben ser desaconsejados fuertemente. Si los tests de estrés descartan isquemia, pueden realizarse deportes recreativos sin contacto	Seguimiento anual con ecocardiografía y/o ECG y/o radiografía de tórax y/o ECG adicional cada 6 meses. Para los pacientes en la primera década de la vida los tests de estrés farmacológicos deben ser considerados	Angiografía si los tests de estrés o la ecocardiografía sugiere estenosis. La cateterización selectiva puede realizarse en algunas circunstancias
Nivel V. Obstrucción de arteria coronaria	3-5 mg/kg/día de AAS en forma continua y/o warfarina. El uso de bloqueadores de los canales de calcio debe considerarse para reducir el consumo de oxígeno	Los deportes de contacto, los ejercicios isométricos y el entrenamiento con pesas deben evitarse. Otras actividades se guiarán por resultados de tests de estrés o scan de perfusión	Ecocardiograma y ECG cada 6 meses, Holter anual y test de estrés	Angiografía recomendada para algunos pacientes para ayudar a seleccionar opciones terapéuticas. Reiterar angiografía ante nueva isquemia o acentuación de isquemia

### 2.1.3.2 Marco Referencial

#### Definición de términos:

#### ENFERMEDAD DE KAWASAKY

**Tabla 1.** Criterios diagnósticos de EK

- Fiebre de más de 5 días de duración.
- Cuatro de los siguientes 5 signos:
  - Conjuntivitis bilateral no exudativa
  - Rash polimorfo
  - Cambios en labios y boca
    - Labios rojos, secos, fisurados
    - Eritema de boca y faringe
  - Cambios en extremidades
    - Eritema de palmas y plantas
    - Edema de manos y pies
    - Descamación manos, pies, periné
  - Adenopatía cervical
    - Mayor 15 mm, unilateral, única, dolorosa, no supurada
- No evidencia de otra enfermedad que explique las manifestaciones clínicas.

#### KAWASAKI ATÍPICO

Un número importante de casos de la enfermedad no reúne las características clásicas y cerca de un 40% de los pacientes que desarrollan alteraciones coronarias tienen presentaciones atípicas (20).

Estos niños presentan fiebre y menos de los cuatro síntomas requeridos para diagnosticar EK. A estos casos se les denomina “Kawasaki atípico” o “Kawasaki incompleto”. Se estima que al menos 10% de los casos de EK son incompletos (24). Estos casos son más frecuentes en niños pequeños, sobre todo lactantes, en donde la probabilidad de desarrollar aneurismas coronarios es mayor.

El diagnóstico en estas situaciones puede ser difícil y se debe tener un alto índice de sospecha ante niños de corta edad que presentan fiebre prolongada sin una causa evidente, o con algunas de las manifestaciones clásicas de la enfermedad. El estudio ecocardiográfico puede ser de gran ayuda, si detecta la presencia de aneurismas coronarios, pero su ausencia no invalida sospechar la enfermedad.

#### **2.1.4 Formulación del problema**

***¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS Y CLINICAS DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, PERIODO 2006 – 2010?***

### **2.2 Objetivos de la investigación**

#### **2.2.1 Objetivo general**

Determinar las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad de Kawasaki en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, periodo 2006-2010.

#### **2.2.2 Objetivos específicos**

1. Describir la prevalencia de enfermedad de Kawasaki.
2. Describir las características epidemiológicas de la enfermedad de Kawasaki.
3. Describir las características clínicas de la enfermedad de Kawasaki.
4. Describir las manifestaciones cardiacas e la enfermedad de Kawasaki
5. Describir los hallazgos de laboratorio encontrados en la enfermedad de Kawasaki.
6. Describir los hallazgos electrocardiográficos de la enfermedad de Kawasaki.
7. Describir el tratamiento instaurado en pacientes con enfermedad de Kawasaki.

### **2.4 Evaluación del problema**

La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio, pero es de vital importancia el conocimiento de las características clínicas para el diagnóstico precoz y el inicio del tratamiento con Inmunoglobulina para disminuir las complicaciones.

## **2.5 Justificación e importancia del problema**

### **2.5.1 Justificación legal**

En el Perú, la enfermedad de Kawasaki es poco frecuente, sin embargo en el HNERM por ser un hospital de referencia hemos tenido varios casos en el que el diagnóstico no ha sido fácil, pero el tenerlo en cuenta es importante ya que el tratamiento precoz disminuye considerablemente sus complicaciones.

### **2.5.2 Justificación teórico-científico**

Los pacientes con enfermedad de Kawasaki tienen un alto riesgo de morir si es que no se inicia un tratamiento oportuno. Si se realiza el diagnóstico de EK en forma precoz, antes del quinto día de iniciada la enfermedad, está justificado el tratamiento con IGIV, ya que se ha determinado que mejora el pronóstico a largo plazo de secuelas coronarias y disminución de la duración de los síntomas



## **CAPITULO III**

### **METODOLOGÍA**

#### **3.1 Tipo de estudio**

- a. Según Altman: Observacional, Retrospectivo y transversal
- b. Según Canales: Es de tipo Descriptivo

#### **3.2 Diseño de investigación**

No experimental

#### **3.3 Población**

Todos los niños menores de 14 años que ingresaron al Servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins con diagnóstico de Enfermedad de Kawasaki en el periodo de 2006-2010.

#### **Unidad de análisis**

Niño menor de 14 años que ingresa al Servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins con diagnostico de Enfermedad de Kawasaki.

#### **Criterios de Inclusión**

- Paciente con Enfermedad de Kawasaky según criterios establecidos.
- Paciente con Kawasaki atípico según criterios establecidos

#### **Criterios de Exclusión**

- Neonato (<28 días de nacido)
- Paciente que presente otro diagnóstico confirmado: Escarlatina, alergia a medicamento.

### 3.4 Operacionalización de variables

VARIABLE	INDICADOR	CATEGORIA/UNIDAD	ESCALA
Edad	Fecha de nacimiento	- Entre 28 días y de 1 año - De 1 a 4 años - Mas de 5 años	Ordinal
Sexo	Sexo	- Masculino - Femenino	Nominal
Kawasaki	Criterios de Enfermedad de Kawasaki	-Típico -Atípico	Nominal
<b>MANIFESTACIONES CLINICAS</b>			
	Fiebre (+ de 5 días)	37.6 – 38.5 >38.5	Intervalo
	Conjuntivitis bilateral	Si No	Nominal
	Rash polimorfo	Si No	Nominal
	Cambios en labio y boca	Si No	Nominal
	Cambios en las extremidades	Si No	Nominal
	Adenopatía cervical	Si No	Nominal
	Artralgia	Si No	Nominal
	Irritabilidad	Si No	Nominal
	Artritis	Si No	Nominal
Frecuencia Cardíaca	Valor de Frecuencia Cardíaca	Bradicardia FC normal Taquicardia (de acuerdo a grupo étnico)	Intervalo
<b>PRINCIPALES HALLAZGOS DE LABORATORIO</b>			
Hemoglobina	Hemoglobina	<11 >11	Razon
Plaquetas	Recuento de Plaquetas	<150 000 150 – 450 >450 000	Razon
Eosinófilos	Porcentaje de Eosinófilos	<4% >4%	Razon
Leucocitosis	Numero de Leucocitos	<4000	Razon

		4000 – 11000 >11000	
Transaminasas elevadas	Valor de Transaminasas	Si No	Nominal
PCR	Valor de PCR	Positivo Negativo (según laboratorio)	Nominal
VSG	Valor de VSG	Positivo Negativo	Nominal
Albúmina	Valor de albúmina	< 3.6 mg/dl > 3.6 mg/dl	Razon
Aneurisma coronario	Presencia de Aneurisma coronario	- Si - No	Nominal
Pericarditis con derrame	Presencia de Pericarditis con derrame	- Si - No	Nominal

### 3.5 Técnica y método de trabajo

Previamente, interiorizado el autor de la investigación, acerca del tema y ser adiestrado por el tutor y dictaminadores sobre los datos a recolectar; se procederá a acudir diariamente al archivo de historias clínicas pediátricas del Hospital Edagardo Rebagliati Martins, donde previa identificación con el personal de dicha institución y con su autorización, se procederá a actuar de la siguiente manera:

- Se acudirá al Archivo de historias clínicas donde se obtendrán los números de las historia clínicas de las pacientes según el CIE 10 que tengan el diagnostico de Enfermedad de Kawasaki, en la base de datos que lleva este servicio, en el tiempo que hemos establecido.

- Posteriormente se procederá a revisar cada una de las historias clínicas, buscando los datos que necesitemos transfiriéndolos a nuestra ficha de recolección ya elaborada. (Anexo 1).

- Finalmente se procederá a la elaboración de una matriz de datos usando el programa Microsoft Excel, donde se colocará la información de datos para su posterior análisis.

### **3.6 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos y otros**

#### **Búsqueda de casos clínicos**

Nº pacientes/año con diagnóstico al alta de Enfermedad de Kawasaki y Kawasaki atípico.

#### **Evaluación demográfica y clínica**

Edad, Sexo Manifestaciones clínicas y complicaciones

### **3.8 Procesamiento y Análisis de datos:**

En el presente estudio se utilizará como método estadístico, la estadística descriptiva, medidas de tendencia central y de dispersión, con la ayuda del paquete estadístico SPSS 13.0.

## **CAPITULO IV**

### **RESULTADOS**

Durante los 5 años (2006-2010) estudiados se identificaron 20 pacientes con diagnóstico de EK.

Respecto a la distribución por sexos 17 (85%) fueron varones y 3 (15%) fueron mujeres (FIGURA 1). Las edades estaban comprendidas: 4 (20%) menores de un año, 13 (65%) entre 1-4 años y 3(15%) mayores de 5 años (FIGURA 2).


Desde el punto de vista clínico, todos los pacientes presentaron fiebre, 17(85%) mas de 38.5°C, del resto de criterios diagnósticos (TABLA I), los más frecuentes fueron rash polimorfo 100%, adenopatías cervicales 100%, seguido de cambios en las extremidades 95%, cambios en la cavidad oral 85% (FIGURA 3), la mayoría de ellos se presentó durante la primera semana de enfermedad. Otras manifestaciones clínicas que también presentaron fueron: articulares 85%, irritabilidad 70%, gastrointestinales 65% (FIGURA 4).

Respecto a las pruebas complementaria , la mayoría de los pacientes presentaron PCR aumentada 95%, leucocitosis 85%, anemia 70%, trombocitosis 65% sobre todo en la segunda semana. Los iones sodio y potasio se encontraron dentro de los límites normales en todos los casos. 55% presentaron hipoalbuminemia. Un 55% presentaron elevación de las transaminasas. Respecto a los reactantes de fase aguda, el 95% presentaron una PCR aumentada y hasta el 50% una VSG aumentada (FIGURA 5,6). En ninguno se realizó punción lumbar.

Respecto al tratamiento, todos los niños recibieron Gammaglobulina y salicilatos, 14 (70%) recibieron gammaglobulina antes de los 10 primeros días de enfermedad, 1 (5%) una segunda dosis de gammaglobulina por persistencia de fiebre, con buena respuesta. No se usaron otros tratamientos. (FIGURA 7,8,9).


A 19 pacientes (95%) se realizaron ecocardiografía en la fase aguda de la enfermedad y controles periódicos cada 6 meses hasta la resolución de las lesiones. El 20% (4) presentaron alteraciones en dicha prueba: 3 niños con ectasia de las arteria coronarias,

**FIGURA 1:**




**FIGURA 2:**

## **Distribución por edades de pacientes con Enfermedad de Kawasaki HNERM, periodo 2006-2010**




**FIGURA 3:**





**FIGURA 4:**




**TABLA I:****CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI**

CARACTERISTICAS CLINICAS		N° DE CASOS	FRECUENCIA
<b>Fiebre</b>		20	100%
<b>Conjuntivitis</b>		20	100%
<b>Cavidad Oral</b>		17	85%
	Eritema de labios	10	50%
	Labios fisurados	6	30%
	Lengua aframbuesada	12	60%
	Sequedad de labios	6	30%
<b>Cambios en las extremidades</b>		19	95%
	Edema de manos y pies	13	65%
	Eritema de palmas y plantas	11	55%
	Descamación de manos y pies	5	25%
<b>Adenopatías</b>		20	100%
	Unilateral	9	45%
	Bilateral	10	50%
<b>Rash polimorfo</b>		20	100%
<b>Otros síntomas</b>			
	Articular	3	15%
	Gastrointestinal	7	35%
	Irritabilidad	6	30%


5% (1) presentó pericarditis (FIGURA 5,6). No se apreciaron aneurismas, valvulopatías ni otras alteraciones. Todos ellos evolucionaron favorablemente, normalizándose estas alteraciones en controles posteriores.

De los 20 niños diagnosticados de EK 1 correspondieron a la forma incompleta y 19 completa.


**FIGURA 5:**




**FIGURA 6**




**FIGURA 7:**




**FIGURA 8:**



**FIGURA 9:**



**FIGURA 10:**





**FIGURA 11:**






FIGURA 12:



**FIGURA 13:**



## CAPITULO V

### DISCUSION

La enfermedad de Kawasaki es una que afecta principalmente a niños en la edad preescolar. En este trabajo la gran mayoría (65%) esta entre 1-4 años. Es más frecuente en varones que en mujeres, como ocurre en este trabajo (85% varones).

La etiología de esta enfermedad es incierta. Una de las hipótesis más aceptadas es la presencia de una agente infeccioso desconocido que actúa en pacientes genéticamente predispuestos. Desde el punto de vista genético, múltiples polimorfismos del HLA como el HLA-B35, HLA-B75, HLACw09 han sido implicados en la etiopatogenia de la misma, y, otros como el HLA-DRB1 o los polimorfismos en la matriz de la metaloproteinasa 3 (MMP-13) se han relacionado con mayor susceptibilidad para lesiones coronarias en pacientes con EK.

Las teoría que explican un agente infeccioso como causante de esta enfermedad tienen varios fundamentos que se basan en aspectos clínicos: similitud con ciertos exantemas infecciosos, epidemiológicos (predominio en las estaciones de invierno y primavera o su distribución de casos en forma cíclica o en brotes), e inmunológicos (la baja incidencia en los primeros meses de vida sugiere la protección por anticuerpos maternos). Estudios experimentales han demostrado la presencia de cuerpos de inclusión intracitoplásmaticos en las células de pacientes con EK, circunstancia que también sugiere una etiología viral. La hipótesis que asocian la enfermedad con toxinas bacterianas plantean que estas actúan como superantígenos, estimulando intensamente la cadena lateral V de los receptores de linfocitos T que da paso a la producción de citoquinas proinflamatorias.

El diagnóstico de esta enfermedad es completamente clínico, se requieren cinco de los seis criterios existentes para la forma completa (en nuestro caso 19) o cumplir con un menor número de criterios y asociar alteraciones coronarias, dando lugar a las formas atípicas o incompletas (en este trabajo 1 caso). La fiebre prolongada (más de 5 días) es criterio imprescindible para llegar al diagnóstico de EK. En este trabajo todos tienen fiebre durante 5 días o más, llegando en ocasiones hasta los 22 días, con una media aproximada de 11 días.

Prácticamente todos los criterios clínicos se presentan generalmente a finales de la primera semana de enfermedad con una media en torno al séptimo día, salvo la descamación ungueal, que se presenta a partir de la segunda semana.

Dentro de los otros síntomas que no se consideran criterios diagnósticos, destacamos la irritabilidad que aparece en un 30% de los casos; otras alteraciones son los síntomas articulares: artralgias, artritis y gastrointestinales: dolor abdominal y deposiciones líquidas.

En este trabajo, como ocurre en otras series consultadas, dentro de las alteraciones analíticas, destaca la elevación de reactantes de fase aguda (PCR y VSG), así como la leucocitosis y la anemia. La trombocitosis puede presentarse en la primera semana, pero suele ser constante a partir de la segunda semana de enfermedad; en este trabajo solo 2 no presentaron trombocitosis en la segunda semana.

Las complicaciones cardiovasculares en forma de aneurismas coronarios son los más importantes de esta enfermedad y la que condicionan el pronóstico de la misma. En determinados países, como Estados Unidos, la EK es la causa más frecuente de cardiopatía adquirida superando a la fiebre reumática. En este trabajo la incidencia de alteraciones cardiovasculares es del 20%, pero en forma de dilataciones (3) y pericarditis (1) que se resuelven en controles posteriores. No encontramos en ningún caso aneurismas, cardiopatía isquémica ni fallecimiento por dicha causa.

Diversos estudios reconocen varios factores de riesgo a la hora de desarrollar alteraciones coronarias; entre ellos, el Harada score, que incluye los siguientes ítems tras 9 días de enfermedad: Leucocitos >12000, sexo varón, edad < 1 año, PCR > 3mg/dl, plaquetas < 350 000, albúmina < 3.5mg/dl, Hto < 35% (41,42). En este trabajo no encontramos diferencias significativas en el grupo con alteraciones ecocardiográficas y los que no presentaron alteraciones, salvo el sexo varón y los días de fiebre, como ocurre en otras guías publicadas, ambas circunstancias parecen incrementar el riesgo de desarrollar alteraciones en las coronarias.

La frecuencia de los aneurismas y de la mortalidad ha disminuido considerablemente al instaurar el tratamiento en la fase aguda con ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatorias y gammaglobulina IV a dosis de 2g/kg. Una vez superada esta fase, el tratamiento tiene como objetivo prevenir la cardiopatía isquémica en pacientes con aneurismas. La precocidad a la hora de instaurar el tratamiento y el uso de la dosis adecuada es fundamental para evitar complicaciones en las arteria coronarias. Se

recomienda iniciar el tratamiento en los primeros 10 días de enfermedad (70% de nuestros pacientes) y, si es posible, en los 7 primeros días. Antes del quinto día, no parece tener eficacia a la hora de evitar secuelas cardíacas. Solo un 5% (1 paciente) no respondió a la primera dosis de gammaglobulina, entendiendo como tal, la persistencia de la fiebre durante las 48 horas posteriores a su administración. Varios estudios identifican varios factores de riesgo para presentar resistencia al tratamiento con gammaglobulina: edad menor de 1 año, sexo varón, leucocitosis, trombopenia, elevación de la PCR y elevación de las enzimas hepáticas. Nuevos marcadores como la IL-6 se postulan como alternativa a los leucocitos o la proteína C reactiva, novedosos estudios muestran niveles de IL-6 más elevados en este tipo de pacientes. También se están realizando estudios genómicos que demuestran la sobreexpresión de varios genes en los pacientes que presentan resistencia al tratamiento con gammaglobulina, entre ellos destaca el antígeno carcinoembrionario (CEA-CAM I) y el factor estimulante de colonia de granulocitos (G-CSF) (43,44).

El uso de los esteroides como tratamiento en la fase aguda, por sí solo o como coadyuvante de la gammaglobulina, sigue estando en entredicho. Los últimos estudios no parecen aportar muchos beneficios a la hora de disminuir aneurismas y puede incrementar los efectos secundarios. Estudios recientes con un número limitado de pacientes sin grupo control presentan buenos resultados con Metrotexato en pacientes refractarios al tratamiento con gammaglobulina (45,46).

Otro estudio compara la eficacia de Infliximab (12 pacientes) con una segunda dosis de gammaglobulina (12 pacientes) en pacientes con EK resistente al tratamiento con gammaglobulina. Once de los pacientes con infliximab presentan desaparición de la fiebre en las primeras 24 horas versus 8 en el grupo con gammaglobulina, sin encontrarse diferencias entre ambos grupos (47).

## CAPITULO VI

### CONCLUSIONES

La enfermedad de Kawasaki es una entidad clínica que plantea un importante reto diagnóstico para el pediatra, que es eminentemente clínico. Su reconocimiento temprano implica la necesidad de su inclusión en el diagnóstico diferencial en pacientes con fiebre y exantema.

Toda vez que se desconoce la etiología de la enfermedad, la mejor intervención médica está centrada en el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. La administración de Gammaglobulina IV, idealmente antes del décimo día de evolución de la fiebre, ha disminuido la incidencia de dilatación coronaria a menos de 5% y de aneurismas gigantes a menos de 1%; además, la mortalidad descendió de 2% a 0.1% (48).

Otros tratamientos como los corticoides, anticuerpos monoclonales (Abciximab, Infliximab) o inmunosupresores (Metrotexate, Ciclofosfamida) se reserva para los casos con escasa respuesta a la gammaglobulina, siendo necesarios nuevos estudios prospectivos para establecer el uso de dichos fármacos. En este estudio no fue necesario administrarlos.

La enfermedad de Kawasaki es la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en Estado Unidos y Asia.

## **CAPITULO VII**

### **RECOMENDACIONES**

El diagnóstico de EK es eminentemente clínico. Es importante iniciar el tratamiento antes de la primera semana de evolución, para evitar lesiones coronarias y secuelas que conduzcan a isquemia cardiaca en la adolescencia o en los adultos jóvenes.

Realizar estudios experimentales en pacientes con enfermedad de Kawasaki.



## CAPITULO VIII

### REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

1. **Burns JC, Kushner HI, Bastian JF, Sjike H, Shimizu C, Matsubara T, et al.** Kawasaki Disease: a brief history. *Pediatrics* 2000; 106(2): 27.
2. **Kawasaki T.** Pediatric acute mucocutaneous lymph node syndrome: clinical observation of 50 cases. *Jpn J Allergy* 1967; 16: 178-222.
3. **Yamamoto T, Oya T, Watanabe A.** Clinical features of Kawasaki disease. *Jpn J Pediatr* 1968; 21: 291-7.
4. **Kawasaki T, Kosaki F, Okawa S, Shigematsu I, Yanagawa H.** A new infantile acute febrile mucocutaneous lymph node syndrome (MLNS) prevailing in Japan. *Pediatrics* 1974; 54(3): 271-6.
5. **Landing BH, Larson EJ.** Are infantile periarteritis nodosa with coronary artery involvement and fatal mucocutaneous lymph node syndrome the same? Comparison of 20 patients from North America with patients from Hawaii and Japan. *Pediatrics* 1976; 59: 651-62.
6. **Melish ME, Hicks RM, Larson EJ.** Mucocutaneous lymph node syndrome in the United States. *Am J Dis Child* 1976; 130: 599-607. Dr. Javier Prego Petit • 111
7. **Rowlay AH, Shulman ST.** Kawasaki Syndrome. *Clin Microbiol Rev* 1998; 11(3): 405-14.
8. **Morens DM, O'Brien RJ.** Kawasaki disease in the United States. *J Infect Dis* 1978; 137: 91-3.
9. **American Academy of Pediatrics.** Kawasaki Disease. In: Peter G, ed. 1988: Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases. 21th. ed. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics, 1988: 251-4.
10. **Dajani AS, Taubert KA, Gerber MA, Shulman ST, Ferrieri P, Freed M, et al.** Diagnosis and treatment of Kawasaki disease in children. *Circulation* 1993; 87: 1776-80.
11. **Wright DA, Newburger JW, Baker A, Sundel RP.** Treatment of immune globulin-resistant Kawasaki disease with pulsed doses of corticosteroids. *J Pediatr* 1996; 128: 146-149.
12. **Furukawa S, Matsubara T, Umezawa Y, Motohashi T, Ino T, Yabuta K.** Pentoxifylline and intravenous gamma globulin combination therapy for acute Kawasaki disease. *Eur J Pediatr* 1994; 153: 663-7.

13. **Caggiani M, Rubio I, Parada P, Lagomarsino G, Guidobono G, Mañé Garzón F.** Enfermedad de Kawasaki. A propósito de un caso. Arch Pediatr Urug 1989; 60(1-4): 65-8.
14. **Laupland KB, Dele Davies H.** Epidemiology, Etiology, and Management of Kawasaki Disease: State of the art. Pediatr Cardiol 1999; 20: 177-83.
15. **Stanley TV, Grimwood K.** Clásical Kawasaki disease in a neonate. Arch Dis Chil Fetal Neonatol 2000; 86: F135-F136.
16. **Stocheim JA, Innocentini N, Shulman S.** Kawasaki disease in older children and adolescents. J Pediatr 2000; 137(2): 250-2.
17. **McCrindel BW, Shulman ST, Burns JC, Kato H, Gersony WM, Newburger JW.** Meeting Report. Summary and abstracts of the Sixth International Kawasaki Disease Symposium. Pediatr Res 2000; 47(4): 544-8.
18. **Du Z, Zhang T, Liang L, Meng, X, Li T, Kawasaki T, et al.** Epidemiologic picture of Kawasaki disease in Beijing from 1995 through 1999. Pediatr Infect Dis J 2002; 21: 103-7.
19. **Royle JA, Williams K, Elliot E, Choller G, Nolan T, Allen R, et al.** Kawasaki disease in Australia 1993-95. Arch Dis Child 1998; 78: 33-9.
20. **Banfi A.** Enfermedad de Kawasaki. Rev Chil Pediatr 2001; 76(6): 487-95.
21. **Yanagawa H, Yashiro M, Nakamura Y, Kawasaki T, Kato H.** Epidemiological pictures of Kawasaki disease in Japan; form the nationwide incidence survey in 1991 and 1992. Pediatrics 1995; 149: 779-83.
22. **Dean AG, Melish ME, Hicks R, Palumbo E.** An epidemic of Kawasaki syndrome in Hawaii. J Pediatr 1982; 100: 552-7.
23. **Rowley AH, Shulman ST.** Síndrome de Kawasaki. Clin Ped NA 1999; 2: 341-59.
24. **Kawasaki T.** Kawasaki Disease. Acta Paediatr 1995; 84: 713-5.
25. **Machado K, Gutiérrez S, Pirez C.** Enfermedad de Kawasaki asociada a virus de Epstein-Barr. Arch Pediatr Urug 2002; 73(4): 220-5.
26. **Leen C, Ling S.** Mycoplasma infection and Kawasaki disease. Arch Dis Child 1996; 75: 226-7.
27. **Ramanan AV, Baildam EM.** Kawasaki disease following meningococcal septicaemia. Arch Dis Chil 2002; 87: 170.
28. **Shibata M, Ezaki T, Hori M, Nagashima M, Morishima T.** Isolation of a Kawasaki disease-associated bacteria sequence from peripheral blood leukocytes. Pediatrics International 1999; 41: 467-473.

29. **Leung D, Meissner HC, Shulman ST, Mason WH, Gerber MA, Glode MP, et al.** Prevalence of superantigen-secreting bacteria in patients with Kawasaki disease. *J Pediatr* 2002; 104(6): 742-6.
30. **Foster BJ, Bernard C, Drummond K.** Kawasaki disease complicated by renal artery stenosis. *Arch Dis Child* 2000; 83: 253-5.
31. **Tabakari B, Mahdhaoui A, Selmi H, Ytacoub M, Essoussi A.** Kawasaki disease with predominant Central Nervous System involvement. *Pediatr Neurol* 2001; 25(3): 239-41.
32. **King WJ, Schlieper A, Birdi N, Capelli M, Korncluk Y, Rowe P.** The effect of Kawasaki disease on cognition and behavior. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2000; 154: 463-8.
33. **Garty B, Mosseri R, Finkelstein Y.** Guttate Psoriasis following Kawasaki disease. *Pediatr Dermatol* 2001; 18(6): 507-8.
34. **Passeron T, Olivier V, Sirvent N, Khalfi A, Boutte P, Lacour JP.** Kawasaki disease with exceptional cutaneous manifestations. *Eur J Pediatr* 2002; 161: 228-30.
35. **Kato H, Hichinose E, Kawasaki T.** Myocardial infarction in Kawasaki disease: clinical analyses in 195 cases. *J Pediatr* 1986; 108: 923-7.
36. **González E, Villanueva J, Ros J, Pons M, Ruiz S.** Enfermedad de Kawasaki. Presentación de cincuenta casos. *An Esp Pediatr* 1999; 50(1): 39-43.
37. **de Zorzi A, Colan SD, Gauvreau K, Baker AL, Newburger JW.** Coronary artery dimensions may be misclassified as normal in Kawasaki disease. *J Pediatr* 1998; 133: 254-8.
38. **Kato H, Inoue O, Akagi T, Sato N, Hashimo K, Maeno Y, et al.** Long-Term consequences of Kawasaki disease. *Circulation* 1996; 94: 1279-85.
39. **Nakamura Y, Yashiro M, Tanihara S, Ojima T, Yanagawa H.** Giant coronary aneurysms due to Kawasaki disease: a case-control study. *Pediatrics International* 2002; 44: 254-8.
40. **Newburger JW, Takahashi M, Beiser AS, Burns JC, Bastian J et al.** A single intravenous infusion of gamma globulin as compared with four infusions in the treatment of acute Kawasaki syndrome. *N Engl J Med* 1991; 324: 1633-9.
41. **Nakamura Y, Yashiro M, Uehara R, Watanabe M, Tajimi M, Oki I, et al.** Use of laboratory data to identify risk factors of giant coronary aneurysms due to Kawasaki disease. *Pediatr Int.* 2004; 46: 33-8.
42. **Uehara R, Belay ED, Maddox RA, Holman RC, Nakamura Y, Yashiro M, et al.** Analysis of Potential Risk Factors Associated With Nonresponse to Initial Intravenous Immunoglobulin Treatment Among Kawasaki Disease Patients in Japan. *Pediatr Infect Dis J.* 2008; 27: 155-160.

43. **Popper S, Shimizu C, Shike H, Kanegaye JT, Newburger JW, Sundel RP, et al.** Gene-expression patterns reveal underlying biological processes in Kawasaki disease. *Genome Biol.* 2007; 8: 261.
44. **Newburger J, Sleeper L, McCrindle B, Minich LL, Gersony W, Vetter VL, et al.** Randomized trial of pulsed corticosteroid therapy for primary treatment of Kawasaki disease. *N Engl J Med.* 2007; 356: 663-675.
45. **Lee TJ, Kim KH, Chun JK, Kim DS.** Low-dose methotrexate therapy for intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease. *Yonsei Med J.* 2008; 49: 714-8.
46. **Ahn SY, Kim DS.** Treatment of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease with methotrexate. *Scand J Rheumatol.* 2005; 34: 136-9.
47. **Burns JC, Best BM, Mejias A, Mahony L, Fixler DE, Jafri HS, et al.** Infliximab treatment of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease. *J Pediatr.* 2008; 153: 833-8. 10 VOL.

## CAPITULO IX

### ANEXOS

## FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

### ***“CARACTERISTICAS CLINICAS Y EPIDEMIOLOGICAS DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, PERIODO 2006 – 2010.”***

FICHA DE RECOLECCIÓN N°.....

#### NOMBRES Y APELLIDOS:

.....

EDAD: .....meses SEXO: F ( ) M ( )

<1 año ( )

1-4 años ( )

≥ 5 años ( )

FECHA DE INGRESO: .....

#### SIGNOS Y SÍNTOMAS

Tiempo de enfermedad: No días:.....

**1. Fiebre (+ de 5 días)** Si ( ) No ( )

• 37.6 – 38.5 ( )

• >38.5 ( )

**2. Conjuntivitis bilateral** Si ( ) No ( )

#### **3. Cambios en labio y boca**

##### ***Labios***

• Eritema ( )

• Sequedad ( )

• Fisuras ( )

##### ***Lengua***

• Aframbuesada Si ( ) No ( )

##### ***Orofaringe***

• Eritema difuso Si ( ) No ( )

#### **4. Cambios en las extremidades**

• Edema de manos y pies ( )

• Eritema de palmas y plantas ( )

- Descamación de manos y pies ( )

**5. Rash polimorfo** Si ( ) No ( )

### **6.Linfadenopatía cervical**

- Unilaterales ( )
- Bilaterales ( )
- Dolorosos ( )

### **Manifestaciones Cardiacas**

Taquicardia Si ( ) No ( )

### **Manifestaciones clínicas asociadas**

Artralgias Si ( ) No ( )

Irritabilidad Si ( ) No ( )

Artritis Si ( ) No ( )

### **Principales hallazgos de laboratorio**

#### **Hemoglobina**

- < 11 ( )
- > 11 ( )

#### **Plaquetas**

- < 150 000 ( )
- 150 – 450 000 ( )
- > 450 000 ( )

#### **Eosinofilia**

- < 4%
- 4%

#### **Leucocitos**

- < 4 000 ( )
- 4000 – 11000 ( )
- > 11 000 ( )

Transaminasas elevadas Si ( ) No ( )

PCR positivo Si ( ) No ( )

VSG aumentada Si ( ) No ( )

#### **Albúmina**

- < 3.6 mg/dl ( )
- > 3.6 mg/dl ( )

### **Ecocardiograma**

Aneurisma coronario Si ( ) No ( )

Pericarditis con derrame Si ( ) No ( )